

专科护理

颅内动脉瘤患者的术后护理要点

□赵雅雯

护理措施

- 1. 生命体征监测 包括心率、血压、呼吸频率... 2. 控制血压 因此，护理人员要密切监测... 3. 颅内压监测 颅内动脉瘤术后，颅内压监测是术后管理的重要环节... 4. 疼痛管理 物如非甾体抗炎药(NSAIDs)或阿片类药物... 5. 预防并发症 清洁干燥，按时更换敷料... 6. 饮食与营养 良好的营养状态对术后恢复至关重要... 7. 心理支持 倾听患者的诉说，帮助他们应对术后的焦虑和恐惧... 8. 康复指导及康复目标设定 术后早期活动有助于预防并发症... 9. 定期随访 便医生评估动脉瘤修复部位的情况...

病例分析

一名64岁的男性患者，于1月前突发右下肢麻木不适，后枕部胀痛，间断恶心、呕吐，急诊以“脑出血(考虑动脉瘤破裂)”为诊断入院...

一致性沟通的应用技巧

□米艳芝

这天，一位患者家属焦急地问医生：“医生，我妈妈的药物过敏还没有完全好，你们就让她办理出院手续，还说我们买的保险不能报销，这不是推卸责任吗？”

我面带微笑地对患者家属说：“您好，我是病区的护士长。您是有保险方面的问题吗？我看看能不能帮上忙。”

我说：“感谢您信任。我能看出来您很着急、很愤怒。”患者家属回答道：“我妈晚上疼得难受，也休息不好。我明明买了保险，现在却赔付不了。”


跟进与反馈：在沟通结束后，及时跟进和反馈，确保双方按照既定计划执行。

患者家属说：“您这样说我就不放心了。谢谢护士长，我就去办理出院手续。”


小发明

一种触屏式上肢功能训练台

□张超 王方 张丹 文/图



触屏式上肢功能训练台的结构示意图



座凳整体的结构示意图

技术背景 偏瘫一般是同一侧上下肢、面肌和舌肌下部的运动障碍，是急性脑血管病的常见症状。轻度偏瘫患者虽然尚能活动，但是走起路来往往上肢屈曲，下肢伸直...

创新内容 这种触屏式上肢功能训练台包括训练桌。训练桌包括位于下方的固定桌体以及位于上方的活动桌体。固定桌体包括固定桌板和固定桌腿。固定桌腿处设有隐藏式座凳...

有益效果 该触屏式上肢功能训练台设置了固定桌体、活动桌体以及设在活动桌体上的触屏游戏机。其中，固定桌体中的固定桌腿处设有隐藏式座凳，可节省占地面积...

征稿

你可以谈一谈护理工作的心得体会，在护理方面取得的新进展，对某种疾病的护理思路以及对护理学发展、管理、改革和教育的建议……